

Identifikationsnummer:

Datum der Blutentnahme:

Geburtsdatum:

Einwilligung vorhanden: ja nein

Geschlecht: männlich weiblich

Periode: ja nein

Erstspender

Folgespender, wenn ja (Anzahl der vorausgegangenen Blutspenden)

1 x 2 x >2 x

Nüchtern: ja nein

Letzte Mahlzeit: >1 h 1-3 h < 3 h

Raucher: ja nein

Lokalisation: Ellenbeuge Unterarm (mittig) Unterarm (distal) Handrücken

Körperseite: rechts links

Venenpunktion: 1 x 2 x >2 x

Bei mehrmaliger Punktion erfolgte die finale venöse Punktion:

Ellenbeuge Unterarm (mittig) Unterarm (distal) Handrücken

rechts links

Blutvolumen: 10 ml 20-50 ml > 50 ml

Abbruch: nein ja

- Unwohlsein
- Kältegefühl
- Kaltschweißigkeit
- Übelkeit
- Erbrechen
- Vasovagale Reaktion (ohne Bewusstseinsverlust)
- Vasovagale Reaktion (mit Bewusstseinsverlust)
- Sonstige:.....

Beurteilung der Punktionsstelle unmittelbar nach Punktion

- Rötung im Bereich der Punktionsstelle
 - mild moderate severe
- Hämatom im Bereich der Punktionsstelle
 - mild moderate severe
- verlängerte Blutungszeit
 - mild moderate severe
- Nervenschmerz/Nervenreizung im Bereich der Punktionsstelle
 - mild moderate severe
- sonstige Schmerzen
- Arterielle Punktion
- Sonstige Komplikationen

Kommentar:

Verlaufsbeurteilung 1- 6 Tage nach venöser Punktion

Telefonisch; bei Bedarf Vorstellung durch den Studienteilnehmer / -teilnehmerinnen

Rötung im Bereich der Punktionsstelle

mild moderate severe

Wie lange bestehend?.....

Hämatom im Bereich der Punktionsstelle

mild moderate severe

Wie lange bestehend?.....

Schmerzen im Bereich der Punktionsstelle

mild moderate severe

Wie lange bestehend?.....

Überwärmung im Bereich der Punktionsstelle

Verhärtung im Bereich der Punktionsstelle

Bewegungseinschränkung

Sonstige Komplikationen

Kommentar:

(Klinischer) Anhalt für

Erysipel

Phlebitis

Thrombophlebitis

Armvenenthrombose

Sepsis

Anämie

Sonstige

Verlaufsbeurteilung 4 Wochen nach venöser Punktion

Telefonisch; bei Bedarf Vorstellung durch den Studienteilnehmer / -teilnehmerinnen

- Rötung im Bereich der Punktionsstelle
 - mild moderate severe

Wie lange bestehend?.....

- Hämatom im Bereich der Punktionsstelle
 - mild moderate severe

Wie lange bestehend?.....

- Schmerzen im Bereich der Punktionsstelle
 - mild moderate severe

Wie lange bestehend?.....

- Überwärmung im Bereich der Punktionsstelle
- Verhärtung im Bereich der Punktionsstelle
- Bewegungseinschränkung
- Sonstige Komplikationen

Kommentar:

(Klinischer) Anhalt für

- Erysipel
- Phlebitis
- Thrombophlebitis
- Armvenenthrombose
- Sepsis
- Anämie
- Sonstige

Kategorie	Mild	Moderate	Severe
Rötung	<0.5 cm	0.5 – 1 cm	>1.0 cm
Hämatom	<0.5 cm	0.5 – 1 cm	>1.0 cm
Schmerzen	1-2/10 VAS*	3-5/10 VAS	>5/10 VAS
Verlängerte Blutungszeit	2-3 min	3-5 min	>5 min

*VAS= Visuelle Analog Skala